


02/12/2015 SSL Page 1 of 6

4.25"

EPA Reg No. 67702-15-239 (24oz)
Ortho Insect Killer Fruit & Vegetable Ready To Use



FIRST AID

IF ON **SKIN OR** CLOTHING: Take off contaminated clothing.

Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes.

Call a poison control center or doctor for treatment advice.

IF IN EYES:

Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes.

Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment. For additional information on this pesticide product, you may call 1-800-225-2883 for emergency medical treatment information.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

CAUTION: Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes. Avoid contact with skin or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or

USER SAFETY RECOMMENDATIONS

- · Users should wash hands with plenty of soap and water before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet.
- Users should remove clothing immediately if pesticide gets inside. Then wash thoroughly and put on

ENVIRONMENTAL HAZARDS

This product is toxic to aquatic organisms including fish and invertebrates. Do not contaminate water when disposing of equipment, washwater, or rinsate. Do not apply directly to or near water. Drift and run-off may be hazardous to fish in water adjacent to treated areas. See Directions for Use for additional precautions

PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS

Combustible. Do not use or store near heat or open flame.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal Law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

USE PRECAUTIONS:

- Some varieties of grapes and cucurbits are sensitive to sulfur and some plant damage may occur.
- Use care or do not spray on sulfur sensitive plants. If not sure, test spray a few leaves 2 days before spraying the

USE RESTRICTIONS:

- Do not apply to strawberry fruit that will be used for canning.
- . Do not wet plants to point of runoff or drip.
- · Do not water the treated areas to point of runoff or drip.
- Do not make applications during rain.
- Not for use in outdoor residential misting systems
- . Do not apply more than 10 times per season.
- Do not reapply within 3 days except under extreme pest pressure.
- In case of extreme pest pressure do not reapply within 24 hours.
- Do not apply more than 1 time per day.
- Do not apply more than 18.5 fl. oz. per 100 square feet per application.
- Do not use if temperatures are expected to be over 90°F.
- Do not apply this product in a way that will contact adults, children or pets, either directly or through drift.
- Remove pets, birds, and cover aquariums before spraying.
- Remove or cover exposed food and drinking water before application. Remove or cover dishes, utensils, food processing equipment, and food preparation surfaces, or wash them before use.
- Do not apply directly to or near water, storm drains, or drainage ditches. Do not apply when windy. To prevent product runoff, do not over water treated area(s) or apply prior to heavy rainfall.
- Do not apply directly into sewers or drains, or to any area like a gutter where drainage to storm sewers, water bodies, or aquatic habitat can occur. Do not allow the product to enter any drain during or after application.
- Do not allow adults, children or pets to enter the treated area until sprays have dried.
- Do not spray plants with Ortho⁴ Insect Killer Fruit & Vegetable Ready To Use within 21 days of an oil spray.

HOW TO USE:

Shake well before using. Do not dilute.

FOR CONTROL OF INSECTS/MITES:

Controls a wide range of pests including: Ants (excluding fire ants, harvester ants, Pharaoh's ants and carpenter ants), Aphids (including Green Peach Aphids), Armyworms, Bagworms, Beet Armyworm, Beetles (including Asparagus Beetle, Bean Beetles, Blister Beetles, Colorado Potato Beetles, 12-spotted Cucumber Beetles, Cucumber Beetles, Darkling Beetles (lesser mealworm), Saw-toothed Grain Beetles, Elm Leaf Beetles, Flea Beetles, Japanese Beetles, Mexican and Bean Beetles), Blow Flies, Borers (including European Corn Borer, and Squash Vine Borer), Cabbage Looper, Cabbageworms (Including Cross-striped Cabbageworm and Imported Cabbageworm), Cankerworms, Caterpillars (including Eastern Tent Caterpillar, Forest Caterpillar, and Tent Caterpillar), Crane Flies, Crickets, Diamondback Moth Larvae, Earwigs, Fireworms, Fungus Gnats, Fruit Flies, Glassy Winged Sharpshooter, Grape Leaf skeletonizer, Green Fruit Worm, Harlequin Bug, Hornworms including Tomato Hornworm, Katydids, Lace Bugs, Leafhoppers (including Grape Leafhopper, and Potato Leafhoppers), Leafminers, Leaftiers, Loopers, Leafrollers (Including Fruittree Leafrollers), Lygus, Maggots (including Apple Maggot and Onion Maggot), Mealy Bugs, Midges, Millipedes, Mites (including Spider Mites and Clover Mite), Moths (including Artichoke Plume Moth, Codling Moth, Diamondback Moth, European Pine Tip Moth, Gypsy Moth (adults and larvae), Indian Meal Moth and Mediterranean Flour Moth), Mushroom Flies,

3

5.375"

3.5625"

3.5625"

5.0"

02/12/2015 SSL Page 3 of 6

Spittlebugs, Squash Bugs, Stink Bugs, Tamished Plant Bug, Thrips Including Greenhouse Thrips, Vinegar Files, Webworms, Weevils, (Including Boll Weevil, Carrot Weevil, Clover Weevil, and Rice Weevil), Whiteflies.

Thoroughly spray all areas of the plant, especially new shoots and underside of leaves. Pests need to be

contacted by the spray to be controlled.

Navel Orangeworm, Pear Psylla, Plant Bugs, Psyllids, Roseslugs, Scale, Silverfish, Skippers, Sowbugs,

For use only on residential gardens. Not for use on agricultural establishments growing agricultural crops or commodities for resale.

USE	SIT	E-	IN	DO	OR	
OUT	DC	OR	A	ND	GR	EEN

FRUIT AND NUT TREES:

almond, apple, cherry, citrus, filbert, nectarine, peach, pear, plum, prune, walnut

VEGETABLE AND VINE PLANTS: beans, beets, blackberries, blueberries, broccoil, brussel sprouts, cabbage, carrots, cauliflower, com, cucurbits (crucumber, meions, pumpkins and squash), currant, gooseberries, grapes, kale, onions, peas, peppers, potatoes,

HOUSE

ants (excluding fire ants, harvester ants, Pharaoh's ants and carpenter ants), armyworms, beetles, cabbageworms, squash vine borer, aphids, mittes, spider mittes, leafnoppers, leafnollers, leafnollers, loopers, onlon maggots, caterpillars, whiteflies, spittlebugs, mealybugs, scale, thrips, psyllids, plant bugs, fruit flies, earwigs,

ants (excluding fire ants, harvester ants, Pharaoh's ants

and carpenter ants), aphids, apple maggot, beetles, mites,

moths, spider mites, leafhoppers, leafrollers, leafminers,

caterpillars, whiteflies, spittlebugs, mealybugs, scale,

thrips, psyllids, plant bugs, fruit files, earwigs

STORAGE AND DISPOSAL

raspberries, strawberries, tomatoes

PESTICIDE STORAGE:

Store at room temperature and protect from freezing.

PESTICIDE DISPOSAL AND CONTAINER HANDLING: Nonrefillable, Do not reuse or refill this container. If empty: Place in trash or offer for recycling if available. If partly filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.



If for any reason you are not satisfied with this product, mail us proof of purchase to obtain a full refund of your purchase price.

PRIMEROS AUXILIOS

SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL

SI ENTRA EN

LOS OJOS:

- Quitese la ropa contaminada.
- Lave inmediatamente la piel con abundante agua durante 15 a 20 minutos.
- CON LA PIEL Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento.
 - Mantenga el ojo ablerto y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15-20 minutos.
 Si tuviera lentes de contacto, quitelos después de lavarse con agua los primeros cinco
 - minutos y después continúe lavando el ojo.
 - Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento.

Tenga a la mano el envase del producto o la etiqueta cuando llame al centro de control de envenenamientos o al médico, o al buscar tratamiento. Para obtener información adicional sobre este producto pesticida, puede llamar al 1-800-225-2883 para obtener información sobre tratamiento de emergencia.

AVISOS DE PRECAUCIÓN

RIESGOS PARA HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

PRECAUCIÓN. Causa irritación moderada en los ojos. Evite el contacto con los ojos. Evite el contacto con la piel o la ropa. Lávese bien con agua y jabón después de manipular el producto y antes de comer, beber, masticar chicle, consumir tabaco o usar el inodoro.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO

- Los usuarios deben lavarse las manos con abundante agua y jabón antes de comer, beber, masticar chicle, consumir tabaco o utilizar el inodoro.
- Si el pesticida entra en la ropa, los usuarios deben quitársela inmediatamente. A continuación, deben lavarse bien y ponerse ropa limpia.

RIESGOS AMBIENTALES

Este producto es tóxico para los organismos acuáticos, incluyendo los peces e invertebrados. No contamine el agua al deshacerse de los utensillos, o del agua que use para lavarlos o enjuagarlos. No aplique este producto directamente o cerca del agua. El producto que se escurra o sea arrastrado por el viento puede ser peligroso para los peces de los cuerpos de agua adyacentes a las superficies tratadas. Lea el Modo de empleo para conocer las precauciones y los requisitos adicionales.

RIESGOS FÍSICOS O QUÍMICOS

Combustible. No utilice ni almacene cerca del calor o el fuego.

5

5.375"

O ECOE

3.5625"-

5.0"

3.5625"

02/12/2015 SSL Page 4 of 6

5.0"

MODO DE EMPLEO

Se considera una violación a la ley federal usar este producto de manera distinta a la indicada en la etiqueta.

- Algunas variedades de uvas y cucurbitáceas son sensibles al azufre y pueden producirse daños en las plantas.
- Tenga cuidado o no rocíe las plantas sensibles al azufre. Si no está seguro, realice un rociado de prueba sobre algunas hojas 2 días antes de rociar la planta completa.

RESTRICCIONES DE USO:

- No aplique sobre las fresas (frutillas) que se utilizarán para enlatado.
- No moje las plantas hasta el punto que el producto se escurra o gotee.
- No riegue las áreas tratadas hasta el punto que el producto se escurra o gotee.
- No haga aplicaciones cuando está lloviendo.
- No debe utilizarse con sistemas residenciales de riego por rocío en exteriores.
- No aplique más de 10 veces por estación.
- No vuelva a aplicar a menos de 3 días excepto cuando existe una presión de plagas extrema.
- Cuando existe una presión de plagas extrema no vuelva a aplicar el producto en menos de 24 horas.
- No aplique más de 1 vez al día.
- No aplique más de 547 ml por cada 9 metros cuadrados por aplicación.
- No utilice si se anticipan temperaturas superiores a los 32° C.
- No aplique este producto de manera que entre en contacto con adultos, niños o mascotas, ya sea directamente o a través de la desviación del producto.
- Retire a las mascotas y aves, y cubra las peceras antes de rociar el producto.
- Antes de la aplicación, retire o cubra los alimentos y el aqua para beber que estén expuestos. Retire o cubra los platos, utensilios, equipo para procesado de alimentos y superficies donde se preparan los alimentos, o lávelos
- No aplique directamente o cerca del agua, drenajes de tormenta o cunetas de desagüe. No aplique el producto cuando el día esté ventoso. Para evitar el escurrimiento del producto, no riegue el/las área(s) tratada(s) en exceso ni lo aplique antes de fuertes lluvias.
- · No aplique directamente en alcantarillas o desagües, ni en cualquier área similar a un canalón donde se pueda producir el drenaje hacia desagües de tormenta, cuerpos de agua o hábitats acuáticos. No permita que el producto ingrese en ningún desagüe durante ni después de la aplicación.
- No permita que los adultos, niños o mascotas ingresen al área tratada hasta que el rociado se haya secado.
- No rocce las plantas con el Insecticida para frutas y vegetales de Ortho® listo para usar dentro de los 21 días posteriores a un rociado de acelte.

CÓMO USAR:

Agite bien antes de usar. No diluir.

PARA CONTROLAR INSECTOS/ÁCAROS: Controla una amplia variedad de plagas, incluyendo: hormigas (excepto hormigas de fuego, hormigas recolectoras, hormigas faraonas y hormigas carpinteras), áfidos

(incluyendo pulgón verde del melocotonero), gusano soldado, oruga de boisón, gusano soldado de la remolacha, escarabajos (incluyendo escarabajo del espárrago, escarabajo del frijol, escarabajo ampolla, escarabajo de la papa de Colorado, escarabajo de 12 manchas del pepino, escarabajo del pepino, escarabajo de la cama, carcoma dentada de los granos, escarabajos de las hojas del olmo, escarabajo de pulga, escarabajo japonés, escarabajo mexicano y escarabajo del frijol), moscardón, barrenadores (incluyendo barrenador europeo del maíz y barrenador de guía de la calabaza), gusano medidor del repollo, gusano de la col (incluyendo gusano de la col rayado y gusano de la col importado), gusano medidor, orugas (incluyendo gusano tendero del este, oruga de tienda de bosque y gusano telarañoso), típula, grillo, gusano de palomilla dorso de diamante, tijereta, gusano de fuego, mosquito de hongo, mosca de la fruta, chicharrita de alas cristalinas, descarnador de la vid, gusano verde de fruta, chinche arlequín, gusansos picudos incluyendo el del tomate, saltamontes longicomios, chinche de encaje, saltarilla (Incluyendo saltarilla de la uva y de la papa), gusano minador, hilador foliar, gusano medidor, polilla lepidóptera (incluyendo polillas lepidópteras de árboles frutales), chinche lygus, gusanos (incluyendo gusano de la manzana y de la cebolla), cochinilla harinosa, chinches chupadoras, milpiés, ácaros (incluyendo arañuelas rojas y arañas rojas del trébol), polillas (incluyendo polilla de los penachos de la alcachofa, polilla de las manzanas y las peras, palomilla dorso de diamante, barrenador de los brotes del pino europeo, polilla gitana (adultos y larvas), polilla india de la harina y polilla mediterránea de la harina), mosca del hongo, gusano de naranja navel, psilido de la pera, insectos de planta, psilidos, babosa de la rosa, cochinilla, lepisma, capitán, cochinilla, gusano escupidor, insectos de planta, chinche hedionda, chinche lygus, tripidos incluyendo trípidos de los Invernaderos, mosca del vinagre, gusano peludo, gorgojos (Incluyendo gorgojo del algodón, gorgojo de la zanahoria, gorgojo del trébol y gorgojo del arroz), mosca blanca.

Rocíe bien todas las áreas de la planta, en especial los nuevos brotes y el reverso de las hojas. El rociado debe entrar en contacto con las plagas para controlarlas.

Para utilizar exclusivamente en jardines domésticos. No debe utilizarse en establecimientos agrícolas dedicados a la cosecha de cultivos o productos para reventa.

LUGARES DE USO: INTERIORES/ EXTERIORES E INVERNADEROS PLAGAS

ÁRBOLES FRUTALES Y DE NUECES: almendros, manzanos, cerezos, cítricos, avellanos, nectarinas, melocotones. perales, ciruelos, pasas secas, nogales

VERDURAS YVIDES:

friioles, remolachas, zarzamoras. arándanos, brócoli, coles de Bruselas, repollos, zanahorias, coliflores, maíz, cucurbitáceas (pepinos, melones, calabazas y zapallos), grosellas, grosellas espinosas, uvas, coles rizadas, cebollas, arvejas, pimientos, papas, frambuesas, fresas (frutillas), tomates

hormigas (excepto hormigas de fuego, hormigas recolectoras, hormigas faraonas y hormigas carpinteras), áfidos, gusanos de la manzana, escarabajos, ácaros, polillas, arañuelas rojas, cicadélidos, polillas lepidópteras, gusanos minadores, orugas, moscas blancas, gusanos escupidores, cochinillas harinosas, cochinillas, trípidos, psílidos, insectos de planta, moscas de las frutas, tijeretas

hormigas (excepto hormigas de fuego, hormigas recolectoras, hormigas faraonas y hormigas carpinteras), gusanos soldado, escarabajos, gusanos de la col, barrenadores de guía de la calabaza, áfidos, ácaros, arañuelas rojas, saltarillas, políllas lepidópteras, gusanos minadores, gusanos medidores, gusanos de la cebolla, orugas, moscas blancas, gusanos escupidores, cochinillas harinosas, cochinillas, trípidos, psílidos, insectos de planta, moscas de las frutas, tijeretas, gorgojos

5.375"

3.5625"

3.5625"-